

眼科藥物介紹及使用注意事項



霖園醫院眼科藥物介紹

- 中文藥名：旺滴點眼液
- 英文藥名：ONE TEAR Eye Drops
- 適應症：淚液補充、眼睛疲勞、眼睛內清潔。
- 用法用量：一日5~6次，一次1~2滴。**(注意) 有戴隱形眼鏡者，須先取出**



霖園醫院眼科藥物介紹

- 中文藥名：滴朗點眼液
- 英文藥名：DELONE Eye Drop
- 適應症：角膜炎、結膜炎、角膜潰瘍，及角膜損傷
- 用法用量：
 1. 日間每小時一次，夜間每兩小時一次
 2. 症狀減輕，可漸減為每四小時一滴，然後再減為每日三至四次
- 副作用：眼睛出現過敏現象時，請中止使用。



霖園醫院眼科藥物介紹

- 中文藥名：鹽酸四環素眼藥膏
- 藥品名稱：Tetracycline HCl Oph oint 1%
- 適應症：是一種抗生素眼藥膏；用於眼部感染之預防及治療
- 用法用量：每日3-4次於眼疾處
- 副作用：眼睛出現過敏現象時，請中止使用。




眼科藥物使用注意事項

- 一、眼藥水或藥膏應保持清潔無菌
在使用眼藥水前後，一定要先用肥皂洗手
- 二、眼藥水一次一至二滴就夠了
請遵照醫師指示的點眼次數即可得到最佳效果
- 三、請勿任意中途停藥
不要自行判斷而中止使用
- 四、眼藥水要妥善儲存
請避免陽光直接照射，保存在陰暗處。開封後一個月以上即應避免使用。
- 五、使用兩種以上眼藥水要間隔5分鐘以上
在同一眼連續點2種以上的眼藥水時，要間隔5分鐘以上點一種藥，才能確保藥物的效果。
- 六、同時使用藥水與藥膏，則先點藥水，最後點藥膏。


眼藥水如何使用

- A & B. 將下眼瞼下拉與眼球分開。
- C. 將眼藥水點在眼睛內。眼藥水點一至二滴即可。
- D. 閉上眼睛至少五分鐘，或以手指輕按壓內眼角處的上、下淚小管至少兩分鐘
- **（注意）** 眼藥水瓶嘴不可以接觸到睫毛或眼睛，以防藥膏瓶受污染。



眼藥膏如何使用

- A 將下眼瞼下拉。將眼藥膏點在眼睛內。眼藥膏約擠出一公分長。
- B. 將上眼皮蓋下。
- C. 閉上眼睛約五分鐘。
- **（注意）** 眼藥膏瓶嘴不可以接觸到睫毛或眼睛，以防藥膏瓶受污染。



有獎徵答

1. 使用眼藥水前後，一定要先用肥皂洗手？

對

2. 使用兩種以上眼藥水要間隔5分鐘以上？

對

3. 眼藥膏瓶嘴不可以接觸到睫毛或眼睛，避免藥膏瓶受污染。

? 對

祝福各位

身體健康

霖園醫院