

用藥過敏要紀錄 有卡有保庇

藥
平安

什麼是藥物過敏？

藥物過敏是服用、塗抹或注射藥物後，引發身體出現特別強烈的免疫反應，免疫系統攻擊人體組織或器官，造成過敏症狀。藥物過敏與個人體質有關，理論上，任何藥物都可能引起過敏。

藥物過敏有哪些症狀？

藥物過敏最常見的是皮膚症狀，如紅疹、搔癢、眼睛或嘴唇腫、脫皮、起水泡等；呼吸系統症狀如喉嚨痛、氣喘、呼吸困難；還有發燒、噁心、心跳加快等，都可能是藥物過敏的症狀。

為什麼要記錄藥物過敏？

曾引起過敏的藥物，如再次誤用，可能引發更嚴重的過敏反應，相當危險，因此務必將過敏藥物註記於「藥物過敏紀錄卡」上，連同健保卡隨身攜帶，就醫時主動出示，提醒醫師避免開立同類藥物，領藥時亦可請藥師幫忙核對，確保用藥安全。

有疑似藥物過敏時，記得先暫停用藥、立即回診，尋求醫療人員協助。



正當使用合法藥物發生嚴重副作用，導致嚴重疾病(住院)、殘障或死亡，得申請藥害救濟，諮詢專線02-23584097。




財團法人藥害救濟基金會



行政院衛生署食品藥物管理局 關心您

藥物過敏

霖園醫院藥劑科




藥物不良反應

□ 世界衛生組織（WHO）定義為：

通常在正常劑量下，藥物使用於預防性給藥、診斷、疾病治療、或改變生理功能時所發生的反應。（藥物在人體上所產生的一種不舒服，有害性或可預期及不可預期的反應。）


□ 可預期：與劑量和藥理作用有關，列如：毒性、副作用、藥物交互作用

□ 不可預期：特異體質反應與過敏反應



什麼是藥物過敏？藥物為什麼會引起過敏？

- 藥物過敏是指服用、塗抹或注射藥物後，引發身體出現免疫性的抗拒反應
- 體內的免疫系統將藥品視為外來物質而產生一種免疫球蛋白E（簡稱IgE）的抗體，這種抗體與體內的某些細胞結合後，促使一些會引起過敏症狀的物質釋出




什麼人容易會藥物過敏？

- 目前無明確的因子
- 遺傳
- 性別
- 年齡
- 用藥史
- 要特別注意者：氣喘患者、腎臟功能不佳、免疫功能缺陷

什麼藥容易引起藥物過敏？

- 任何藥物都有引起過敏的可能性。
- 有幾類藥物是較常出現的，如下
 - ．降尿酸藥（allopurinol）
 - ．抗癲癇藥（carbamazepine、phenytoin）
 - ．非類固醇類消炎止痛藥
 - ．抗生素、磺胺藥





藥物過敏依發生的速度分為

- 立即型只需幾分鐘、幾小時。
- 遲緩型服藥後24到72小時之間發作，如果是從沒吃過的藥，則會在第7至14天左右產生過敏反應
- 一旦有過敏症狀，務必立即停藥、立即就醫。

藥物過敏症狀


- 輕者如：
發疹、搔癢、眼睛及
嘴唇紅腫
- 嚴重者如：
呼吸困難、血壓降
低、心跳變慢、休
克、皮膚潰爛、肝
炎、腎臟受損…等



當懷疑藥物過敏時？如何處理？

- 立即停藥
- 回原醫院或診所就診
- 將服用藥物攜帶回診，由醫生來判定，並適當治療
- 醫療人員會協助記錄可能引起過敏的藥物
- 當下次就診時，主動告知醫師，以免再次使用過敏藥物。

藥物過敏紀錄卡



姓名：


若您曾經有過敏紀錄，請將此卡連同健保卡隨身攜帶，就醫時主動出示。

【我對下列藥物過敏】

請將您會過敏的藥名記錄在本卡，也可請醫療人員(社區藥局)協助填寫。


藥名	反應

財團法人藥害救濟基金會 關心您
FDA 行政院衛生署食品藥物管理局



有獎徵答

1. 任何藥物都有可能引起過敏？對
2. 當發生藥物過敏時，要攜帶所開立藥物立即回原醫院就診？對
3. 有藥物過敏史，當看病時，一定要主動告知醫師？對



祝福各位

身體健康

霖園醫院