

104年度流感疫苗暨 肺炎鏈球菌疫苗

護理部

104.09.29

類流感定義


突然發病、有發燒（耳溫大於或等於 38°C ）及流鼻水、喉嚨痛、咳嗽，且有肌肉痠痛、頭痛、極度倦怠感，與一般感冒相似者。



流行性感 冒病毒

分為三型：A、B、C型

- A型常導致嚴重的病患，造成大規模流行
- B型多半侵襲孩童，引起較輕微的地方性流行。
- C型只會造成非常輕微的症狀或完全沒有症狀，並不會造成大流行。



流感病毒傳播途徑

■ 飛沫

- 主要的傳染途徑

- 飛沫主要產生咳嗽，噴嚏和說話間

■ 直接接觸

■ 間接接觸

流行性感 冒病毒—高危險群

- 5歲以下的兒童(特別是2歲以下)
- 65歲以上之老人
- 長期服用阿斯匹靈的兒童或青少年(18歲以下)
- 孕婦
- 有慢性肺、心血管、肝、腎、血液、神經、
肌肉、或代謝疾病的成人和兒童
- 免疫抑制(藥物或愛滋病病毒造成)的成人
或兒童
- 護理之家和其他慢性照顧機構住民

潛伏期

可能的範圍是1~7天

最高機率是1~4天

傳染期

時間長短未明

- 流感病毒為發病的**前**一天至症狀消除為止
- 發病前一天到發病後七天被視為具有傳染性
- 兒童，特別是年幼的兒童，傳染期可能長達十天

流行性感冒病毒—臨床症狀

- 發燒、頭痛、肌肉痠痛、無力、疲倦、喉嚨痛、咳嗽等，通常在2~7天內會康復。
- 約有10%感染者有噁心、嘔吐以及腹瀉等腸胃道症狀伴隨呼吸道症狀。
- 白血球數減少。
- 胸部X光：肺膨脹不全或侵潤。

流行性感 冒病毒—併發症

- 中耳炎
- 肺炎—急性出血性(壞死性)肺炎、膿胸，或繼發性細菌感染
- 急性肌炎(肌肉炎、橫紋肌溶解症)
- 神經炎(急性感染後腦病變、腦炎、熱痙攣、癲癇重積狀態)
- 心肌炎、心包膜炎
- 毒性休克症候群：B型流行性感 冒
- 細菌感染：肺炎鏈球菌、流行嗜血桿菌、金黃色葡萄球菌

流感的預防

接種公費流感疫苗

流感疫苗

- 流感疫苗為不活化疫苗，保護力約只維持一年，必須每年接種一次。

104年流感疫苗抗原成份：

A—(H1N1)

A—(H3N2)like virus

B—(like virus)

計畫對象

項目	實施時程	對象
計畫對象	104.10.01 至 疫苗用罄	65歲以上老人(民國37年後)、機構對象急罕見病患
		滿6個月以上至國小六年級幼兒/學童
		醫事及衛生防疫相關人員
		禽畜業及動物防疫相關人員
		重大傷病患者
		年滿50~64歲高風險慢性病患
		孕婦(取得媽媽手冊即可接種)
後補對象	105.01.01 至 疫苗用罄	50歲以下具糖尿病、肝、心、肺、血管、腎臟及免疫低下等疾病門、住診紀錄者

兒童接種劑量及途徑

年齡	劑量	劑數	途徑
6-35個月	0.25	1-2	肌肉注射
3-8歲	0.5	1-2	肌肉注射
9歲以上	0.5	1	肌肉注射

- ❖ 兒童8歲以下，首次接種者：2劑，間格至少四週
- ❖ 國小學童於學校及中接種，全面接種一劑

肺炎鏈球菌疫苗接種對象定義

本計畫所需之疫苗，由前台塑企業王永慶、王永在創辦人所成立之「財團法人王詹樣社會福利慈善基金會」等捐贈，提供全國75歲以上長者接種需求。

■ 75歲以上老人(民國27年後)，且未曾注射過肺炎鏈球菌之長者。

■ 接種過之長者，健保卡上有貼紙註記。

霖園醫院 公費流感疫苗暨肺炎鏈球菌收費標準

公費疫苗施打日期：104 年 10 月 1 日~疫苗用罄

身分別	掛號費	診察費	醫材費	注射費	證件
滿 3-6 歲	0	100 (健保局支付)	0	0	兒童手冊 健保卡
65 歲以上長者 罕見疾病	0	100 (健保局支付)	0	0	身分證 健保卡
重大傷病	100 (自付)	0	0	0	重大傷病、罕見疾 病讀卡或證明紙本
慢性病患	100 (自付)	0	0	0	身分證 健保卡 高風險慢性疾患門 住診記錄
孕婦	100 (自付)	0	0	0	孕婦手冊
候補對象	150 (自付)	0	0	0	身分證 健保卡 慢性疾患門住診記 錄

注意事項

- * 65歲以上長者無健保身分者，請統一至衛生所接種，免掛號及診察費。
- * 凡注射流感及肺炎鏈球菌疫苗者，均需測量血壓及體溫。
- * 3-6歲首次接種者，第一劑請於11月30日前完成，第二劑請於12月31日前完成接種。
- * 同時注射流感及肺炎鏈球菌疫苗者，
左手流感、右手肺炎。

接種前注意事項

1. 對蛋過敏者
2. 過去注射發生不良反應者
3. 經醫師評估不適合接種者
4. 發燒或急性病患者不予接種
5. 請攜帶身分證及健保卡，六歲以下兒童請攜帶健保卡及兒童手冊。

接種後注意事項

1. 接種後少數人可能發生注射部位疼痛、紅腫、發燒、倦怠的輕微反應，一、二天內會恢復，嚴重的副作用則極少發生。
2. 接種後應於診所內或附近稍微休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。
3. 疫苗接種後，雖可降低感染流感機率，但仍有可能罹患流感或感冒，還是需注重保健與各種防疫措施，以維護身體健康
4. 接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫。

報告完畢

謝謝聆聽

有獎徵答

1. 預防流感最有效的方法就是接種流感疫苗

1. 是 2. 不是

答：是

2. 疫苗接種後，雖可降低感染流感機會，但仍有可能罹患感冒，仍需注意保健與防疫措施，以維護身體健康

1. 是 2. 不是

答：是